



## Préambule

Cette technique est complémentaire dans le traitement de la plagiocéphalie postéro-latérale, et du torticolis associé. La dysfonction en torsion spiralée du segment supérieur de la dure-mère est probablement primaire à la majorité d'autres dysfonctions.

## Position du sujet

Le nouveau-né est en position physiologique, flexion cervicale (« cocoon a baby »)

Le sujet est en décubitus, l'opérateur va tenir le nourrisson confortablement entre sa main céphalique et sa main caudale.

## Premier temps

L'ostéopathe, place une main céphalique sous l'occiput et les doigts de sa main caudale en fulcrum sur la zone T3, T4 et T5.

L'opérateur éloigne sa main caudale de sa main céphalique, pour réaliser une mise en tension du manchon de la dure-mère, dans le sens de la correction, en visualisant le déroulement de la spirale de la dure-mère.

L'ostéopathe avec sa main occipitale met en tension dans le sens de la correction jusqu'au point d'équilibre de la dure-mère spinale.



**MISE EN TENSION ET DÉTORSION PAR LA MAIN CÉPHALIQUE**

## Deuxième temps

Quand le relâchement des tissus apparaît, l'opérateur inverse le point fixe, la main dorsale devient active et gagne en amplitude selon la réponse tissulaire.



**DÉTORSION PAR LA MAIN CAUDALE**

**Nb :** Cette manœuvre comme la précédente sera répétée plusieurs fois.